



Alertissements[®]

Agriculteurs de l'Auvergne & Limousin

Grandes cultures

Le 17 Novembre 1986

n°18

CEREALES : surveiller encore les pucerons

CEREALES

Stades (tallage - semis précoces (début Octobre)
(2-3 feuilles - semis mi-Octobre
(levée : semis fin Octobre à début Novembre

PUCERONS

★ Situation

- Les parcelles semées tôt ont nécessité une protection vers le 20 Octobre, du fait des fortes infestations de pucerons (bulletin n° 17 du 15 Octobre).

Actuellement, ces parcelles sont dans l'ensemble pratiquement indemnes.

- Pour les parcelles levées dès la fin Octobre, une augmentation des infestations est en cours depuis le 10 Novembre.

★ Préconisations

Les parcelles levées depuis la fin Octobre peuvent nécessiter une intervention dès que 15 à 20 % des plantes sont colonisées.

Maintenir une surveillance tant qu'il n'y aura pas de fortes gelées.

P.154

DESHERBAGE

Informations sur MEGA PLUS (1ère année expérimentation au SPV)

★ Composition

pendiméthaline + imazaméthabenz

★ Utilisation

- En post-levée (1 feuille à plein tallage)
- Avant tallage des graminées et prélevée des dicotylédones
- Sur blé tendre et orge d'hiver
- Dose : 5 l/ha

★ Résultats des essais SPV

☆ Sélectivité

Dans les conditions de la campagne précédente, ce produit a provoqué des symptômes visuels de phytotoxicité dans 4 essais sur 15 et même une réduction de population de l'ordre de 25 % dans l'essai Auvergne (ST-BONNET-PRES-RIOM - 63).

☆ Efficacité

- Bon anti-graminées globalement équivalent à la référence DICURAN.
- Meilleure action sur Vulpin et surtout Folle-avoine.
- Plus irrégulier sur pâturin.
- Sans action sur Ray-grass.
- Sur dicotylédones, dans les conditions de l'année, efficacité très comparable à celle de BELGRAN.
- Moins efficace sur matricaires, stellaires.
- Mieux sur véroniques et renouées.
- Mauvais sur pensées.

★ Conclusions

Spécialité à positionner à l'automne.

Intéressant sur Folle-avoine

L'expérimentation sera poursuivie afin de vérifier la sélectivité et l'efficacité.